

FYLGISEÐILL

Nerfasin vet. 20 mg/ml, stungulyf, lausn, fyrir nautgripi, hesta, hunda og ketti

1. HEITI OG HEIMLISFANG HANDHAFA MARKAÓSLÉYFIS OG ÞESS FRAMLEIÐANDA SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAM-ÞYKKT, EF ANNAR

Markaósléyfishafi

Le Vet B.V.,
Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Holland

Framleiðandi sem sér um lokasamþykkt:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer
Holland

2. HEITI DÝRALYFS

Nerfasin vet. 20 mg/ml, stungulyf, lausn, fyrir nautgripi, hesta, hunda og ketti
Xylazín (sem hydróklóríð)

3. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Í hverjum ml:

Virkt innihaldsefni:

Xylazín (sem hydróklóríð): 20,0 mg
(jafngildir 23,31 mg xylazín hydróklóríðs)

Hjálpafefni:

Metylparahýdroxybenzóat (E218): 1,0 mg
Tær, litlaus lausn.

4. ÁBENDING(AR)

Svæving.
Lyfjaforgjör samhlíða svæingarlyfi.

5. FRÁBENDINGAR

- Gefið ekki dýrum sem hafa teppu í meltingarvegi vegna þess að vöðvaslakandi eiginleikar lyfsins virðast auka á áhrif teppunnar og vegna hættu á uppköstum.
- Gefið ekki dýrum með alvarleg skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi, skerta öndunarstarfsemi, hjartasjúkdöma, lágbrýsting og/eða dýrum í losti.
- Gefið ekki sykursjúkum dýrum.
- Gefið ekki dýrum með sögu um flög.
- Gefið ekki yngri en 1 viku gömlum kálfum,
- 2 vikna gömlum folöldum eða 6 vikna gömlum hvolpum og kettlingum.
- Notið ekki á síðasta stigi meðgöngu (vegna hættu á ótímabærri fæðingu), nema við fæðingu (sjá kafla 4.7).

6. AUKAVERKANIR

Almennt gildir að aukaverkanir sem eru dæmigerðar fyrir α2-adrenvirka örva geta komið fram, svo sem hægtaaktur, tímabundnar taktrufnarir og lágbrýstingur. Líkamshitasýring kann að verða fyrir áhrifum og líkamshiti kann því að lækka eða hækka eftir umhverfshita. Skert öndun og/eða öndunarstopp geti einnig komið fram, sérstaklega hjá köttum.

Kettir og hundar

- Uppköst eru algeng hjá hundum og köttum í upphafi slævingar með xylazíni, sérstaklega þegar dýr hafa nýlega verið fôðruð.
- Munnvatnsrennsli dýra gæti verið mikið í kjölfar innðælingar með xylazíni.
- Aðrar aukaverkanir hjá hundum og köttum eru: vöðvaskjálfti, hægur hjartsláttur með gáttaslegl-arofi (AV-block), lágbrýstingur, hægari öndun, hreyfingar í kjölfar skyndilegs hljóðáreitis, blóð sykurskækkun og auknið þvaglát hjá köttum.
- Hjá köttum veldur xylazín legsamdráttum og getur leitt til ótímabærs gots.
- Hjá hundum eru aukaverkanir almennt meira áberandi eftir innðælingu undir húð miðað við gjöf í vöðva og verkun getur verið ófyrirsjáanlegri.
- Greint hefur verið frá sjaldgæfum tilvikum af þembu í næstum hundum með stóran brjóst-kassa (Great Dane, Irish Setter).
- Hjá dýrum sem voru svæfð var órjalsdan greint frá hjarta- eða öndunartruflunum (hjartastoppi, mæði, hægöndun, lungnabjúg, lágbrýsting) og einkennum frá taugakerfi (krömpum, örmögnun, ljósopsröskunum, skjálftum).

Nautgripir

- Hjá nautgripum getur xylazín leitt til ótímabærs burðar og það dregur einnig úr hreiðrun eggis.
- Nautgripir, sem hafa fengið stóra skammta af xylazíni, hafa stundum skitu í 24 klukkustundir eftir lyfjagjöfina.
- Aðrar aukaverkanir eru hrotur, mikil slefa, spennuleysi í vömb, spennuleysi tungu, bakflæði, uppbemba, blísturhljóð í nös, lágur líkamshiti, hægtaaktur, aukin þvaglát og framfall reðurs sem gengur til baka.
- Hjá nautgripum eru aukaverkanir almennt meira áberandi eftir innðælingu í vöðva miðað við gjöf í æð.

Hestar

- Hestar svitna oft þegar slæving gengur til baka.
- Greint hefur verið frá verulegum hægtakti og hægari öndun, einkum hjá hestum.

- Eftir notkun lyfsins handa hestum kemur yfirleitt fram tímabundin blóðþrýstingshækkun og þar á eftir lækkan blóðþrýstings.
- Greint hefur verið frá tíðari þvaglátum.
- Vöðvaskjálfti og hreyfingar í kjölfar skyndilegs hljóð- eða líkamshitis geta hugsanlega komið fram. Greint hefur verið frá óflugum viðbrögðum hesta þegar xylazín er gefið, en þau eru þó sjaldgæf.
- Slingur og framfall reðurs sem gengur til baka geta komið fram.
- Í mjög sjaldgæfum tilvikum getur xylazín leitt til væms ristlikrampa vegna þess að þarmahreyfingar minnka tímabundið. Sem forvörn skal ekki gefa hestinum fôður eftir slævingu fyrr en hún hefur gengið til baka að fullu.

Geridýralækni viðvart ef vart verður alvarlega aukaverkana eða aukaverkana sem ekki eru tilgreindar í fylgiseðlinum.

7. DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir, hestar, hundar og kettir.

8. SKAMMTAR FYRIR HVERJA DÝRA-TEGUND, ÍKOMULEIÐ(IR) OG AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÓF

Nautgripir: í bláæð, í vöðva.

Hestar: í bláæð.

Hundar: í vöðva.

Kettir: í vöðva, undir húð.

Nautgripir:

Skammtar:

Skammtastærðir handa nautgripum

Skammtastærð*	xylazín (mg/kg)	Nerfasin vet. 20 mg/ml (ml/100 kg)	Nerfasin vet. 20 mg/ml (ml/500 kg)
A. Í vöðva			
I	0,05	0,25	1,25
II	0,1	0,5	2,5
III	0,2	1	5
IV	0,3	1,5	7,5
B. Í bláæð			
I	0,016-0,024	0,08-0,12	0,4-0,6
II	0,034-0,05	0,17-0,25	0,85-1,25
III	0,066-0,10	0,33-0,5	1,65-2,5

* Skammtur I: Slæving með smávægilegri minnkun vöðvaspennu. Óskert geta til að standa.

* Skammtur II: Slæving verklein minnkun vöðvaspennu og nokkur verkjæðeyfing. Dýrið

stendur yfirleitt en gæti lagst niður.

- * Skammtur III: Mikil slæving, meiri minnkun vöðvaspennu og þó nokkur verkjæðeyfing. Dýrið leggst niður.
- * Skammtur IV: Mjög mikil slæving, mikil minnkun vöðvaspennu og þó nokkur verkjæðeyfing. Dýrið leggst niður.

Hestar

Skammtar: stakur skammtur af 0,6-1 mg xylazíni fyrir hvert kg líkamspýngdar. (3-5 ml af lyfinu fyrir hver 100 kg líkamspýngdar).

Hundar

Skammtar: stakur skammtur af 0,5-3 mg xylazíni fyrir hvert kg líkamspýngdar. (0,025-0,15 ml af lyfinu fyrir hver 1 kg líkamspýngdar).

Kettir

Skammtar: stakur skammtur af 0,5-1 mg xylazíni í vöðva eða undir húð fyrir hvert kg af líkamspýngd. (0,025-0,05 ml af lyfinu fyrir hver 1 kg líkamspýngdar).

Ekki skal stinga gat á tappann oftar en 20 sinnum.

Skrá skal fjölda gata á ytri pakkningar.

9. LEIÐBEININGAR UM RÉTTA LYFJAGJÓF

Innleiðing í bláæð skal vera hæg, sérstaklega hjá hestum.

10. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Nautgripir:

Kjöt og innmat: Einn dagur
Mjólk: Núll klukkustundir

Hestar:

Kjöt og innmat: Einn dagur
Mjólk: Núll klukkustundir

11. GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa. Má ekki nota eftir frymingardagsetninguna sem stendur á eftir Fryrnist á glasinu. Geymsluþol eftir innri umbúðir hafa verið rofnar: 28 dagar. Ekki skal stinga gat á tappann oftar en 20 sinnum.

12. SÉRSTÖK VARNADARORÐ

Sérstök varnaðarorð fyrir hverja dýrategund

Hestar:

- Xylazín hamlar eðlilegum þarmahreyfingum. Þess vegna skal aðeins gefa lyfið þeim hestum með magakveisu sem

ekki svara meðferð með verkjastillandi lyfjum. Forðast skal að gefa hestum með vanstarfsemi í botnristli xylazín.

- Eftir meðferð hesta með xylazíni eru dýrin treg til að ganga og því skal gefa lyfið á þeim stadi þar sem meðferðin/rannsóknin fer fram, þegar þau er hægt.
- Gæta skal varúðar þegar lyfið er gefið hestum sem hætt er við höfsperru.
- Hestar með sjúkdóm eða vanstarfsemi á öndunarvegum gætu fengið lífshættulega mæði.
- Hafa skal skammtinn eins lítinn og hægt er.
- Notkun með annarri lyfjaforgjöf eða með svæfingarylfjum skal aðeins fara fram að undangengnu mati á ávinningi og áhættu. Við matið skal taka tillit til þess hvaða lyf eru notuð, skammta og eðlis aðgerðarinnar. Ráðlagðir skammtar fara almennt eftir því svæfingarylfi sem er notað.

Hundar og kettir:

- Xylazín hamlar eðlilegum þarmhreyfingum. Slæving með xylazíni kann af þessum sökum að vera óhentug fyrir rönggenmyndun ákvarðunarvegi, vegna þess að það yfir undir gagnsófnun í maga og eykur óvissu við túlkun á rönggenmyndum.
- Hundar með breiðan og stuttan haus, sem eru með sjúkdóm á öndunarvegum gætu fengið lífshættulega mæði.
- Notkun með annarri lyfjaforgjöf eða með svæfingarylfjum skal aðeins fara fram að undangengnu mati á ávinningi og áhættu. Við matið skal taka tillit til þess hvaða lyf eru notuð, skammta og eðlis aðgerðarinnar. Ráðlagðir skammtar fara almennt eftir því svæfingarylfi sem er notað.

Nautgripir:

- Jörturdýr eru afar næm fyrir áhrifum xylazíns. Nautgripir standa yfirleitt þegar litir skammtar eru gefnir, en sum dýr leggjast niður. Við hæsta ráðlagða skammt leggjast flest dýr niður og sum dýr gætu lagst á hlíð.
- Vöðvahreyfingar í keppi og vömb minnka eftir innndælingu xylazíns. Slíkt getur valdið þembu. Ráðlagt er að gefa hvorki föður né vatn í nokkrar klukkustundir fyrir innndælingu xylazíns.
- Hjá nautgripum helst geta til að ropa, hósta og kyngja en gæti minnkað meðan á slævingu stendur og því skal fylgjast náið með nautgripum á meðan þeir koma úr slævingu. Láta skal dýrin liggja á bringunni (sternal recumbency).
- Lífshættulegar aukaverkanir geta komið fram hjá nautgripum þegar gefnir eru með innndælingu í

vöðva skammtar sem eru yfir 0,5 mg/kg líkamsþyngd (öndunar- og blóðrásarbilun). Skómtun þarf þess vegna að vera mjög nákvæm.

- Notkun með annarri lyfjaforgjöf eða með svæfingarylfjum skal aðeins fara fram að undangengnu mati á ávinningi og áhættu. Við matið skal taka tillit til þess hvaða lyf eru notuð, skammta og eðlis aðgerðarinnar. Ráðlagðir skammtar fara almennt eftir því svæfingarylfi sem er notað.

Sérstakar varúðarreglur við notkun hjá dýrum
Haldið dýrum rólegum, því þau geta brugðist við ytra áreiti.

Forðist innndælingu í slagæð. Þemba gæti komið fram hjá dýrum sem liggja á hlíðinni. Koma má í veg fyrir þetta með því að láta dýrin liggja á bringunni (sternal recumbency). Til að koma í veg fyrir ásvælingu munnavnts eða föðurs skal lækka höfuð og háls dýrsins að bringu. Látið dýr fasta áður en lyfið er notað.

- Gömul og slitin dýr eru viðkvæmari fyrir xylazíni og taugaveikluð eða mjög æst dýr gætu þurft stærri skammt.
- Ef dýrin eru viðkvæskert skal gæta varúðar við notkun xylazíns.
- Uppköst koma yfirleitt fram 3-5 mínútum eftir inngjöf xylazíns hjá hundum og köttum. Ráðlagt er að láta hunda og ketti fasta í 12 kl. fyrir aðgerð en þeir mega hafa frjálstan aðgang að drykkjarvatni.
- Forgjöf með atrópín hjá hundum og köttum getur dregið úr munnavntsrensli og hægtakti.
- Gefið ekki stærri skammt en þann sem er ráðlagður.
- Ráðlagt er að kæla dýr þegar umhverfshiti er hærr en 25°C og að halda hita á dýrum þegar umhverfshiti er lágur.
- Við sársaukafullar aðgerðir skal alltaf nota xylazín með staðdeyflyf eða svæfingarylfi.
- Xylazín veldur að vissu marki skertri samhæfingu vöðva og því skal gæta varúðar við notkun xylazíns í aðgerðum sem fela í sér neðri hluta útlíma og við standandi geldingu hesta.
- Fylgjast skal náið með dýrum sem eru meðhöndluð þar til verkinin hefur horfið á öllu leyti (þ.e. starfsemi hjarta og öndunarfaræra, einnig eftir aðgerð) og halda skal dýrinu áðöskulu frá öðrum dýrum til að koma í veg fyrir áttök.
- Sjá aldurstakmarkanir í kafla 4.3 um notkun handa ungunum dýrum. Ef gefa á lyfið dýri sem er undir þessum aldurstakmörkunum skal dýralæknir framkvæma mat á ávinningi og áhættu.

Sérstakar varúðarreglur fyrir þann sem gefur dýrinu lyfið

- Ef sá sem annast lyfjagjöf tekur dýralyfið niður fyrir slýsni eða sprautar sig með dýralyfinu fyrir slýsni skal tafarlaust leita til læknis og hafa meðferðis fylgiseðil dýralýfisins, en EKKI KEYRA, vegna þess að lyfið getur valdið slævingu og haft áhrif á blóðþrýsting.
- Ef lyfið berst á húð skal strax skola hana með miklu vatni.
- Fjarlægjið menguð fót sem eru í snertingu við húð.
- Ef lyfið kemst af slýsni í snertingu við augu skal skola þau með miklu hreinu vatni. Ef einkenni koma fram skal leita til læknis.
- Ef þunguð kona meðhöndlar lyfið skal gæta sérstakrar varúðar til að koma í veg fyrir innndælingu fyrir slýsni vegna þess að legsamdrættir og lækkaður blóðþrýstingur í fostri getu komið fram ef lyfið kemst í blóðrás konunnar fyrir slýsni.

Upplýsingar til læknisins:

Xylazín er a2-adrenvirkur örvi. Einkenni eftir frásög geta verið klínísk áhrif á borð við skammtaháða slævingu, hægtakt, lágþrýsting, munþurrk og blóðsýkurshækkun. Einnig hefur verið greint frá sleglatakttruflunum. Áhrif á öndunarferi og blóðrás skal meðhöndla í samræmi við einkenni.

Notkun á meðgöngu, við mjólkurgjöf og varp
Þrátt fyrir að rannsóknir á rottum hafi ekki sýnt fram á vanskapandi eða fostureitrandi áhrif skal aðeins nota dýralyfið á fyrstu tveimur þriðjungum meðgöngu að undangengni ávinnings-/áhættumati dýralæknis. Dýralyfið má ekki nota síðar á meðgöngunni (sérstaklega hjá nautgripum og köttum) nema við áfenging, vegna þess að xylazín veldur legsamdráttum og getur leitt til ótímabærrar fæðingar. Dýralyfið má ekki gefa nautgripum sem fá ígrædd egg vegna þess að aukin spennan í legi getur minnkað líkur á hreidrun eggisins.

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Önnur lyf sem bæla miðtaugakerfið (barbitúröt, sterk verkjalyf, svæfingarylf, róandi lyf o.s.frv.) geta leitt til aukinnar bælingar á miðtaugakerfinu ef þau eru notuð með xylazíni. Minnka gæti þurft skammt þessara lyfja. Því skal gæta varúðar við notkun xylazíns samhliða sefandi eða róandi lyfjum. Ekki má nota xylazín samhliða adrenvirkuum lyfjum eins og adrenalíni því það getur leitt til sleglatakttruflana.

Greint hefur verið frá því að samtímis notkun efdra (potentiated) súlfónamíða með alfa-2-örvum, gefið í bláæð, valdi hjartsláttartruflunum sem geta verið banvænar. Þrátt fyrir að ekki hafi verið greint frá slíkum verkunum með þessu lyfi er ráðlagt að gefa ekki í bláæð lyf sem innihalda trimetoprími/súlfónamíð þeim hestum sem hafa verið slævðir með xylazíni.

Ofskömmun (einkenni, bráðameðferð, móteitur), ef þörf krefur

Við ofskömmun fyrir slýsni geta hjartsláttartruflunir, lágþrýstingur og mikil bæling miðtaugakerfis og öndunar komið fram. Einnig hefur verið greint frá flogum eftir ofskömmun. Gefa má að 2-adrenvirka blokka til að vinna á móti xylazíni.

Eftirfarandi mótefni eru ráðlögð við ofskömmun:

Dýrategundir	Virkt innihaldsefni	Skammtar
Hundar	Yohimbín	0,125 mg/kg
	Tólasólín	5,0 mg/kg
	Atipamezól	0,2 mg/kg
Kettir	Yohimbín	0,1-0,4 mg/kg
Nautgripir	Atipamezól	0,03 mg/kg
	Yohimbín	0,125 mg/kg
	4-aminópýridín	0,3 mg/kg
Hestar	Atipamezól	0,15 mg/kg

Ráðlagt er að nota öndunarbúnað með eða án öndunarörvandi lyfjum (t.d. doxapram) til að meðhöndla öndunarbælandi áhrif xylazíns.

13. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR ÖNOTAÐRA LYFJA EÐA FERGANGS, EF VIÐ Á

Ekki má flegja lyfjum í skólplagnir eða heimlíssorp. Leiði ráða hjá dýralækni um hvernig heppilegast er að losna við lyf sem ekki þarf að nota lengur. Þetta er gert til þess að vernda umhverfið.

14. DAGSETNING SÍÐUSTU SAMÞYKKTAR FYLGISEÐILSINS

12. október 2012.

15. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Hettuglösu sem innihalda 10 ml, 25 ml eða 50 ml. Ekki er víst að allar þakkingnastærðir séu markaðsettar.

Einingus dýralæknir má gefa dýralyfið. ML-númer: IS/2/12/009/01