

FYLGISEÐILL FYRIR:

Canicaral vet 40 mg töflur handa hundum

1. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA OG ÞESS FRAMLEIDANDA SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAMPYKKT, EF ANNAR

Markaðsleyfishafi:

Le Vet. Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland

Framleiðandi sem ber ábyrgð á lokasampykkt:

Artesan Pharma GmbH & Co KG
Wendlandstrasse 1, Lüchow
29439, Þýskaland

2. HEITI DÝRALYFS

Canicaral vet 40 mg töflur handa hundum
karprófen

3. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

1 tafla inniheldur:

Virkt innihaldsefni:

Karprófen 40,0 mg

Ljósbrún með brúnum dílum, kringlótt og kúpt bragðbætt tafla með krosslagra deilistriki á annarri hliðinni.

Töflunum má skipta í 2 eða 4 jafna hluta.

4. ÁBENDING(AR)

Til að draga úr bólgu og verkjum af völdum stoðkerfiskvilla og slitgigtar. Til að draga úr verkjum eftir aðgerðir í kjölfar verkjameðhöndlunar með stungulyfi.

5. FRÁBENDINGAR

Gefið ekki köttum.

Gefið ekki hvolpafullum né mjólkandi tíkum.

Gefið ekki hvolpum yngri en fjögurra mánaða.

Gefið ekki dýrum sem hafa ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna.

Gefið ekki hundum sem hafa hjarta-, lifrar eða nýrnasjúkdóma vegna þess möguleiki er á sáramyndun í meltingarfærum (sáramyndun í maga og þörmum) eða blæðingu, eða þar sem vísbendingar eru um blóðmein (blóðsjúkdóma).

6. AUKAVERKANIR

Tilkynnt hefur verið um dæmigerðar aukaverkanir sem tengjast NSAID (bólgueyðandi gigtarlyfum) eins og uppköst, linan saur/niðurgang, dulblóð (blóð í hægðum sem er ekki sýnilegt), lystarleysi og drunga (orkuleysi). Pessar aukaverkanir koma yfirleitt fram á fyrstu viku meðferðar, eru í flestum tilfellum skammvinnar og hverfa eftir að meðferð er hætt, en kunna í mjög sjaldgæfum tilvikum að vera alvarlegar eða banvænar.

Ef aukaverkanir koma fram skal hætta notkun lyfsins og leita til dýralæknis.

Eins og við á um önnur bólgueyðandi gigtarlyf er hætta á sjaldgæfum aukaverkunum á nýru eða sérkennilegum (idiosyncratic) aukaverkunum á lifur.

Gerið dýralækni viðvart ef vart verður alvarlegra aukaverkana eða aukaverkana sem ekki eru tilgreindar í fylgiseðlinum.

7. DÝRATEGUND(IR)

Hundar

8. SKAMMTAR FYRIR HVERJA DÝRATEGUND, ÍKOMULEIÐ(IR) OG AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til inntöku.

Til að tryggja rétta skammta skal ákvarða líkamsþyngd eins nákvæmlega og unnt er til að forðast ofskömmtu.

Skammtar

2 - 4 mg karprófen fyrir hvert kg líkamsþyngdar á dag.

Til að draga úr bólgu og verkjum vegna stoðkerfiskvilla og slitgitar: Upphafsskammturinn 4 mg af karprófeni á dag fyrir hvert kg líkamsþyngdar, gefið í einum skammti eða í tveimur jöfnum skömmum samkvæmt klínískri svörun, má minnka í 2 mg karprófen/kg líkamsþunga/dag, í einulagi. Lengd meðferðar fer eftir svörun dýrsins. Ef meðferðin stendur lengur en í 14 daga skal hundurinn vera undir reglulegu eftirliti dýralæknis. Ekki skal gefa stærri skammt en ráðlagt er.

Til að lengja verkjastillandi og bólgueyðandi verkun eftir aðgerð, má gefa karprófen töflur eftir karprófen stungulýfsgjöf fyrir aðgerð í skammtinum 4 mg/kg líkamsþunga/dag í allt að 5 daga.

Eftirfarandi tafla er ætluð til leiðbeiningar við gjöf lyfsins í skammtinum 4 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag.

Fjöldi taflna fyrir skömmtunina 4 mg/kg líkamsþyngdar

Líkamsþyngd (kg)	Canicaral vet 40 mg einu sinni á dag	Canicaral vet 40 mg tvísvar sinnumá dag	Canicaral vet 160 mg einu sinni á dag	Canicaral vet 160 mg tvísvar sinnumá dag
> 2,5 kg - 5 kg	□			
> 5 kg - 7,5 kg	⊕	□ □		
> 7,5 kg - 10 kg	⊕⊕	⊕ ⊕		
> 10 kg - 12,5 kg	⊕⊕	⊕ ⊕		
> 12,5 kg - 15 kg	⊕⊕□	⊕⊕		
> 15 kg - 17,5 kg	⊕⊕⊕	⊕⊕		
> 17,5 kg - 20 kg	⊕⊕⊕	⊕⊕		
> 20 kg - 25 kg	⊕⊕⊕	⊕⊕	⊕	□ □
> 25 kg - 30 kg	⊕⊕⊕⊕	⊕⊕ □ ⊕ ⊕		
> 30 kg - 35 kg	⊕⊕⊕⊕	⊕⊕ ⊕ ⊕	⊕	⊕ ⊕
> 35 kg - 40 kg	⊕⊕⊕⊕⊕	⊕⊕ ⊕ ⊕		
> 40 kg - 50 kg	⊕⊕⊕⊕⊕	⊕⊕ ⊕ ⊕	⊕	⊕ ⊕
> 50 kg - 60 kg			⊕ ⊕	⊕ ⊕
> 60 kg - 70 kg			⊕ ⊕	⊕ ⊕
> 70 kg - 80 kg			⊕ ⊕	⊕ ⊕

□ = $\frac{1}{4}$ tafla


⊕ = $\frac{1}{2}$ tafla

⊕⊕ = $\frac{3}{4}$ tafla

⊕⊕⊕ = 1 tafla

9. LEIÐBEININGAR UM RÉTTA LYFJAGJÖF

Töflunum má skipta í 2 eða 4 jafna hluta til að tryggja nákvæma skömmtu. Leggið töfluna á slétt yfirborð þannig að deiliskoruhlið hennar snúi upp og kúpta (rúnnaða) hliðin snúi að yfirborðinu.



Helmingar: Þrýstið með þumalfingrunum ofan á báðar hliðar töflunnar.

Fjórðungar: Þrýstið með þumalfingrinum ofan á miðju töflunnar.

10. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANYTINGU

Á ekki við.

11. GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Töflu sem hefur verið skipt skal nota innan 3 daga.

Setjið alla ónotaða töfluhluta aftur í opnu þynnuna til varnar gegn ljósi.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluáðstæður óopnuðu þynnunar.

EKKI SKAL NOTA DÝRALYFIÐ EFTIR FYRNINGARDAGSETNINGU SEM TILGREIND ER Á MERKIMIÐANUM Á EFTIR EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

12. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ

Sérstök varnaðarorð fyrir hverja dýrategund:

Notkun handa gömlum hundum getur falið í sér aukna áhættu.

Ef ekki er hægt að komast hjá slíkri notkun, geta hundarnir þurft að vera undir nákvæmu klínísku eftirliti.

Forðist notkun hjá hundum með vessaþurrð, blóðþurrð (lítið blóðmagn) eða lágþrýsting (lágan blóðþrýsting) vegna hugsanlegrar hættu á auknum eiturverkunum á nýru (nýrnaskemmdum).

Bólgeyðandi gigtarlyf eins og karprófen kunna að valda hömlun á agnaáti (einu af ferlum ónæmiskerfisins), og því skal hefja viðeigandi sýklalyfjameðferð samhliða við meðhöndlun á bólgu af völdum bakteríusýkingar.

Sjá einnig kaflann: Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir.

Sérstakar varúðarreglur fyrir þann sem gefur dýrinu lyfið:

Ef dýralyfið er óvart tekið inn, skal tafarlaust leita til læknis og hafa meðferðis fylgiseðil eða umbúðir dýralyfsins. Þvoið hendur eftir að lyfið er handleikið.

Meðganga og eða mjólkurgjöf:

Rannsóknir á tilraunadýrum (rottum og kanínum) hafa sýnt fram á að lyfið kann að valda eiturverkunum á fóstur við skammta sem eru nálægt ráðlöögðum skömmum. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi dýralyfsins á meðgöngu eða við mjólkurgjöf. Ekki er mælt með notkun dýralyfsins hjá hvolpafullum eða mjólkandi tíkum.

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir:

Gefið ekki önnur bólgeyðandi gigtarlyf og sykurstera samhliða eða innan 24 klst. eftir notkun lyfsins. Karprófen er mikið bundið plasmapróteinum og getur keppt við önnur mikið bundin lyf sem kann að leiða til eiturverkana.

Forðist samhliða notkun lyfja sem kunna að hafa eiturverkanir á nýru.

Ofskömm tun (einkenni, bráðameðferð, móteitur):

Engin merki um eituráhrif komu fram þegar hundar voru meðhöndlaðir með karprófeni í skömmum allt að 6 mg/kg líkamsþyngdar tvívar á dag í 7 daga (3 sinnum hæsta ráðlagðan skammtahlutfall fyrir 4 mg/kg líkamsþunga) og 6 mg/kg líkamsþyngdar einu sinni á dag í 7 daga til viðbótar (1,5 sinnum hæsta ráðlagða skammtahlutfall fyrir 4 mg/kg líkamsþyngdar).

Ekkert sértækt mótefni er til við ofskömm tun karprófens, en veita skal sömu almenna stuðningsmeðferð eins og við klíníkska ofskömm tun bólgeyðandi gigtarlyfja.

13. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR ÓNOTAÐRA LYFJA EÐA ÚRGANGS, EF VIÐ Á


Farga skal ónotuðu dýralyfi eða úrgangi vegna dýralyfs í samræmi við gildandi reglur á hverjum stað.

14. DAGSETNING SÍÐUSTU SAMPYKKTAR FYLGISEÐILSINS

Júní 2015.

15. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Pappaaskja með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 eða 50 þynnur með 10 töflum.
Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.



Skiptanleg tafla